

# Элементы 18 группы

## Благородные газы

# Элементы 18 группы

1      2

13    14    15    16    17    18

H					(H)	<b>He</b>		
Li	Be		B	C	N	O	F	<b>Ne</b>
Na	Mg		Al	Si	P	S	Cl	<b>Ar</b>
K	Ca	<i>d</i> -block	Ga	Ge	As	Se	Br	<b>Kr</b>
Rb	Sr		In	Sn	Sb	Te	I	<b>Xe</b>
Cs	Ba		Tl	Pb	Bi	Po	At	<b>Rn</b>
Fr	Ra							

**He** – гелий, **Ne** – неон, **Ar** – аргон,  
**Kr** – криpton, **Xe** – ксенон, **Rn** – радон

# Свойства элементов

	He	Ne	Ar	Kr	Xe	Rn
Ат. N	2	10	18	36	54	86
Эл. конф.	1s <sup>2</sup>	2s <sup>2</sup> 2p <sup>6</sup>	3s <sup>2</sup> 3p <sup>6</sup>	3d <sup>10</sup> 4s <sup>2</sup> 4p <sup>6</sup>	4d <sup>10</sup> 5s <sup>2</sup> 5p <sup>6</sup>	4f <sup>14</sup> 5d <sup>10</sup> 6s <sup>2</sup> 6p <sup>6</sup>
Радиус ПМ	122	160	192	198	218	220
I <sub>1</sub> (эВ)	24.60	21.56	15.75	14.02	12.13	10.75
I <sub>2</sub> (эВ)	54.42	40.96	27.63	24.36	21.20	21.80
χ <sup>AR</sup>	5.50	4.84	3.20	2.94	2.40	2.06
C.O.	0	0	0	0,(2)	0,2,4,6,8	0,2,(4),(6)

# Свойства элементов

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Rn

Ат. N

2

10

18

36

54

86

Эл.

$1s^2$



$2s^22p^6$

$3s^23p^6$

$3d^{10}4s^24p^6$

$4d^{10}5s^25p^6$

$4f^{14}5d^{10}6s^26p^6$



# Свойства элементов


	He	Ne	Ar	Kr	Xe	Rn
Ат. N	2	2	2	2	2	86
Эл. конф.	$1s^2$	$2s^2$	$2s^2 2p^6$	$2s^2 2p^6 3s^2$	$2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$	$2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^10 4p^6$
Радиус	122	2	2	2	2	220
ПМ						
$I_1$ (эВ)	24.60	2	2	2	2	10.75
$I_2$ (эВ)	54.42	2	2	2	2	21.80
$\chi^{AR}$	5.50	4.84	3.20	2.94	2.40	2.06
C.O.	0	0	0	0,(2)	0,2,4,6,8	0,2,(4),(6)

The graph illustrates the variation of the Madelung constant ( $\chi^{AR}$ ) across the noble gases. The x-axis represents the atomic number (N) from Helium (He) to Radon (Rn). The y-axis represents  $\chi^{AR}$ . The curve shows a clear downward trend as the atomic number increases, indicating a general decrease in the Madelung constant for the noble gases.

Element	Atomic Number (N)	$\chi^{AR}$
He	2	5.50
Ne	10	4.84
Ar	18	3.20
Kr	36	2.94
Xe	54	2.40
Rn	86	2.06

## Физические свойства Ng


	He	Ne	Ar	Kr	Xe	Rn
Т.пл. (°C)	—	-249	-189	-157	-112	-71
Т.кип. (°C)	-268.94	-246	-185	-153	-108	-62
$\Delta_v H_{\text{бр}}^0$ кДж/моль	0.08	1.71	6.43	9.08	12.62	18.0
d, г/л (н.у.)	0.18	0.90	1.78	3.75	5.90	9.73
растворимость в воде при н.у. (мл/кг $\text{H}_2\text{O}$ )	8.6	10.5	33.6	59.4	108.0	230



Ng одноатомны в газовой и жидкой фазах, имеют кристаллическую решетку меди в твердой фазе.

# Особенности Не

Не демонстрирует особый тип поведения при низких  $t^o$



0-вариантные  
равновесия:

С: Не-I <sub>ж</sub> , Не-II <sub>ж</sub> , тв	λ-точка (2.19 K)
А: Не-I <sub>ж</sub> , Не-II <sub>ж</sub> , газ	

Не-II – сверхтекучесть, высокая теплопроводность

# Открытие Ng


1. Аргон (ленивый, недеятельный)  
непрореагировавший остаток воздуха  
Рамсэй, Рэлей, 1892
2. Гелий (солнечный)  
анализ солнечного спектра. Локьер, 1894
3. Криптон (скрытный, секретный)  
фракционирование воздуха. Рамсэй, 1898
4. Неон (новый)  
спектральный анализ фракционированного воздуха  
Рамсэй, 1898
5. Ксенон (чужой, странный)  
спектральный анализ фракционированного воздуха  
Рамсэй, 1898
6. Радон (аналог радия)  
в продуктах распада радия. Резерфорд, Содди, 1901

# Распространение Ng

1. **He** – 2й по распространенности элемент Вселенной  
Всегда присутствует в природном газе в результате  $\alpha$ -распада, до 7 об.%
2. **Ar** – 0.93% в атмосфере
3. **Ne, Kr, Xe** – следовые количества в атмосфере
4. **Rn** – в продуктах распада  $^{238}\text{U}$

Содержание Ng в атмосфере, %

<b>He</b>	0.00052
<b>Ne</b>	0.0018
<b>Ar</b>	0.93
<b>Kr</b>	0.0011
<b>Xe</b>	0.0000087



## **Получение и применение Ng**

- 1. He, Ar**      из природного газа, после сжижения  
                      остальных компонентов
  - 2. Ne**              остаток после сжижения воздуха
  - 3. Kr, Xe**          селективная адсорбция воздуха углем
- 

- 1. He, Ar** – создание инертной атмосферы в лаборатории  
и на производстве
- 2. Ne** – как легкий, негорючий газ, охладитель, в  
дыхательной смеси для глубоководных работ
- 3. Ne, Kr, Xe** – в разрядных лампах
- 4. Ar** – наполнитель ламп накаливания
- Rn** – в медицине
- XeF<sub>2</sub>** – как лабораторный окислитель
- Xe** – в ракетном топливе нового поколения


# Соединения Ng

1. Короткоживущие ионы, содержащие Ng. Существуют только в газовой фазе при пониженном давлении
2. Клатраты Ng. Устойчивы при н.у. Не содержат химической связи между атомами Ng и клатратной решеткой, кроме ван-дер-Ваальсова взаимодействия.
3. Истинные химические соединения. Образованы в основном Xe с наиболее электроотрицательными элементами – F, O, реже – N, Cl, C.

# Короткоживущие ионы Ng

1.  $\text{HeH}^+$

впервые получен в 1925 г.



К.с. = 1, но:  
малая устойчивость из-за  
малой поляризуемости



стремление к распаду  
с образованием  $\text{He}^0$

2. Гомоатомные катионы



$E_{\text{дисс.}}$ кДж/моль	228.0	130.9	122.2	110.9	99.2
Уменьшение устойчивости					

уменьшение устойчивости

# Клатраты Ng

1. Клатраты построены по типу «гость-хозяин»

Ng – гость, заключенный в решетку хозяина, не связанный с ним ковалентными связями

2. Типы клатратов Ng:

а) с водой



Ar—Rn



Ar—Rn

б) с гидрохиноном



Ar—Xe

в) с фенолом



Xe, Rn



Ar, Kr

г) с пара-хлорфенолом



Xe, Rn

д) с толуолом




Rn

# Клатраты Ng


1. Клатраты построены по т

Ng – гость, заключен  
связанный с ним кова



2. Типы клатратов Ng:

а) с водой



Дядин Ю.А.  
(1935-2002)


## Клатраты Ng

3. Образование и устойчивость клатратов определяется комплементарностью гостя и хозяина

Для кратратов Ng:

Комплементарность – соответствие формы и размера полости каркаса хозяина размеру сферического атома Ng

4. Устойчивость  $8\text{Ng}@\text{46H}_2\text{O}$




увеличение устойчивости

5. Получение:

совместная кристаллизация при высоком давлении

# Открытие химии Xe


1. Первое истинное соединение Ng (Бартлетт, 1962)



(оказалось смесью  $[\text{XeF}][\text{PtF}_5] + [\text{XeF}][\text{Pt}_2\text{F}_{11}] + \dots$ )

По аналогии с  $\text{O}_2 + \text{PtF}_6 = [\text{O}_2][\text{PtF}_6]$

$$I_1(\text{Xe}) \approx E(\text{O}_2 \rightarrow \text{O}_2^+) \approx 12.1 \text{ эВ}$$





Эксперимент  
Бартлетта

# Фториды Xe


2. Фториды Xe – наиболее стабильные соединения Xe

	XeF <sub>2</sub>	XeF <sub>4</sub>	XeF <sub>6</sub>
T.пл., °C	140	117 (возг.)	49
Δ <sub>f</sub> H <sup>0</sup> <sub>298</sub> , кДж/моль	–109	–216	–294
d(Xe–F), пм	200	195	189
молекулярная геометрия	линейная	квадратная	октаэдрическая




# Фториды Xe

## 3. Получение





$$\Delta_r H^0_{298} = -175 \text{ кДж/моль}$$




# Фториды Xe

## 4. Разделение






## 5. Гидролиз



# Фториды Xe


## 6. Фторирующие агенты, окислители




# Фториды Xe

## 7. Строение $\text{XeF}_2$

Строение всех фторидов Xe → метод Гиллеспи








Ионизация под давлением





# Фторокомплексы Xe

## 1. Фторокатионы Xe







(77 K)






$\text{Mg}(\text{XeF}_2)(\text{XeF}_4)(\text{AsF}_6)_4$




# Фторокомплексы Xe



# Фторокомплексы Xe





# Фторокомплексы Xe




# Фторокомплексы Xe

## 2. Оксофториды Xe



устойчив



## 3. Фтороксенаты



# Кислородные соединения Xe

## 1. Оксиды Xe



бесцветные кристаллы  
нелетуч


$$\Delta_f H^0_{298} = +402 \text{ кДж/моль}$$




светло-желтый газ  
неустойчив

$$\Delta_f H^0_{298} = +642 \text{ кДж/моль}$$

очень взрывчатые вещества !





$$d(\text{Xe}-\text{O}) = 176 \text{ пм}$$
$$\angle(\text{O}-\text{Xe}-\text{O}) = 103^\circ$$





$$d(\text{Xe}-\text{O}) = 174 \text{ пм}$$
$$\angle(\text{O}-\text{Xe}-\text{O}) = 109.45^\circ$$

# Кислородные соединения Xe

## 2. Получение






## 3. Свойства




# Кислородные соединения Xe

## 4. Окислители



# Кислородные соединения Xe





Окислитель, но не взрывчат!

# Другие соединения Xe

## 1. Соли $\text{Xe}^{2+}$





## 2. Соединения со связью $\text{Xe}-\text{Cl}$ , $\text{Xe}-\text{N}$




# Другие соединения Xe

## 3. Комплексные соединения



# Другие соединения Xe

## 4. Соединения с d-металлами



$d(\text{Au}–\text{Xe}) = 274 \text{ пм}$

## 5. Комплексы $\text{Xe}_2^+$




$\text{Xe}_2^+$   $d(\text{Xe}–\text{Xe}) = 309 \text{ пм}$

парамагнитен

устойчив до  $-60^\circ\text{C}$


## 6. «Гидриды» Xe



# Соединения Kr, Rn



- Для Kr известны только дифторид и его производные
- KrF<sub>2</sub> – белый, твердый, т.разл. ≈ 25 °C

$$\Delta_f H_{298}^0 = +60 \text{ кДж/моль}$$




- Соединения Rn мало изучены


Rn – α-эмиттер  $\longrightarrow$  разлагает соединения



# Соединения Kr, Rn



# Соединения He, Ar



«Электрид»  $(\text{Na}_2\text{He}^0)(\text{e}^-)_2$

